




IMAGE1 S™ Rubina™ – дізнайтеся більше!

Застосування при холецистектомії

Дізнайтеся більше про вплив флуоресцентної візуалізації при пошкодженні жовчних проток та вплив анастомотичних витоків на пацієнтів та лікарні.



Вплив пошкоджених жовчних проток на лікарні та пацієнтів

Аналіз витрат завдяки різним дослідженням показує вплив пошкоджених жовчних проток на пацієнтів та лікарні.

Різниця у вартості для одного пацієнта за один рік:¹

Збільшення часу перебування в лікарні

Пошкодження жовчних проток подовжує час перебування пацієнта у лікарні середньому на 32 дні та тривалість амбулаторної допомоги на 10 днів.²

Без пошкоджень жовчних проток

По

Візуалізація жовчних проток за допомогою флуоресцентної візуалізації

Чи знали ви


що **97%** усіх пошкоджень жовчних проток обумовлені зоровою перцептивною ілюзією?

та що **19%** пацієнтів мають нетипову анатомію жовчних проток?²

IMAGE1 S™ Rubina™ – різні режими флуоресцентного зображення

Накладення

NIR/ICG сигнал проти білого світла ⁶



Відображення у зеленому або синьому кольорах ⁵



1. Fong Z V, et al., Diminished Survival in Patients with Bile Leak and Ductal Injury: Management Strategy and Outcomes. J Am Coll Surg. 2018; 226(4); 568:576; doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2017.12.023
2. Dip F., et al., ENDO-PRESS® Silverbook, Fluorescence Cholangiography, 2017
3. R C Broderick, et al., Fluorescent cholangiography significantly improves patient outcomes for laparoscopic cholecystectomy. doi: 10.1007/s00464-020-08045-x

4. Schols RM, et al., Fluorescence cholangiography during laparoscopic cholecystectomy: a feasibility study on early biliary tract delineation; 2013; 00464-0122635-3
5. Prof. Luigi Boni, IRCCS, Ca' Granda, Policlinico Hospital, Milan, Italy
6. Prof. Massimo Carlini, Ospedale S. Eugenio, Rome, Italy
7. Dr. Michael Zünd, Zuger Kantonsspital, Baar, Switzerland

* Equivalent to approx. 18,407 € (currency exchange in 2018)

** Equivalent to approx. 50,493 € (currency exchange in 2018)

22.377 \$*

Пошкодження жовчних проток **зменшує життєдіяльність** пацієнтів у перший рік на 30-50%.²

Пошкодження жовчних проток

61.384 \$**

ICG може допомогти прискорити ідентифікацію жовчних проток за **8-10 хвилин**.⁴

ICG Холангіографія може сприяти поліпшенню результатів пацієнта. Це покращує **візуалізацію** анатомії жовчовивідних шляхів і тим самим **зменшує частоту пошкоджень** жовчних проток.³


Монохромний

Сигнал NIR / ICG білого кольору на чорному фоні ⁵



Карта інтенсивності

Інтенсивність сигналу NIR/ICG із використанням шкали кольорів ⁷



Перед використанням рекомендується перевірити придатність продукту до передбачуваної процедури.
Зверніть увагу, що описані продукти у цьому носії можуть бути доступні ще не у всіх країнах через різні вимоги законодавства.

More than
75
Years

*Shaping the Future
of Endoscopy with you*

STORZ
KARL STORZ—ENDOSKOPE

THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Germany
Phone: +49 7461 708-0
Fax: +49 7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com
www.karlstorz.com

